

RECERVIN®

Přípravek na ochranu rostlin

Speciální postřikový přípravek k ochraně jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvířel.

Účinná látka: směs repelentních látek 68%

Údaje o výrobku :

Recervin je stříkatelná pastovitá směs ředitelná vodou, šedohnědé barvy, charakteristického zápachu, obsahující čichové a chutňové repelentní látky (přírodního a syntetického původu).

Účinná látka: směs repelentních látek 68%

Označení z hlediska speciálních rizik přípravku:

R 36/37 - Dráždí oči a dýchací orgány

R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží



Xi - dráždivý

Pokyny pro bezpečné zacházení :

S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí

S 20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při práci

S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima

S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít

S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití !

Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2.pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek je zakázáno použít jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí.

Zařazení z hlediska ochrany včel, zvířat a ryb :

Vč 3 - Přípravek je pro včely relativně neškodný při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny

Z 3 - Přípravek je pro zvířata relativně neškodný

Pt 6 - Přípravek je pro ptáky relativně neškodný

Vo 4 - Přípravek ,jeho zbytky a obaly po použití se nesmějí dostat do povrchové vody

Uč 4 - Přípravek je relativně neškodný pro populace všech druhů užitečných členovců.

Rozsah použití :

Recervin je určený výhradně k ochraně kmenů a kořenových náběhů jehličnatých a listnatých stromů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvířel.

Jehličnany je možno ošetřit celoplošně, u listnáčů s hladkým povrchem kůry pouze bodováním nebo v pruzích. Aplikaci nelze provádět při teplotách nižších než +5 °C a na zmrzlém povrchu dřevin. Po ošetření musí přípravek alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek zajišťuje ochranu proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvířel až 8 let. Delší účinnost přípravku se zajistí očištěním kmene (kartáčem, drsnou rukavicí) od šupin kůry, prachu, lišejníků a pod..

Údaje o použití :

Recervin je určen pro přímou aplikaci postřikem. Před aplikací je nutno přípravek řádně promíchat. V případě zhoustnutí přípravku jej za stálého míchání naředít vodou v maximálním poměru 3 díly přípravku na 1 díl vody (vodu vždy naléváme za stálého míchání do přípravku, nikdy naopak). Větším ředěním se snižuje repelentní účinnost a mohlo by dojít k porušení suspenze. Naředí se však pouze takové množství přípravku, které lze okamžitě spotřebovat. Připravovat zásobní naředěný přípravek pro aplikaci v následujících směsích se nedoporučuje. Po zaschnutí je přípravek vodou nerozpustný.

K postřiku jsou vhodné tlakové postřikovací přístroje s membránovým čerpadlem a s tryskou o průměru 1 - 1,2 mm. Při plnění přístroje je třeba procedit přípravek sítím o velikosti ok do 1 mm.

Stromy ošetřené postřikem není nutné vyvětňovat. Přípravku se nanáší pouze takové množství, aby nedocházelo ke stékání. Při eventuální aplikaci náterem štětcem nebo kartáčem se nesmí přípravek opakovaně roztírat. Na celoplošně ošetřeném kmenu se utvoří souvislá vrstva hnědé barvy, která po zaschnutí zčerná a poskytuje dlouhodobou ochranu před letním loupáním a zimním ohryzu zvířel.

Pomůcky a přístroje, použité při práci s Recervinem, je třeba ihned po použití vymýt dokonale 3% roztokem sody ve vodě. Funkční část postřikovačů je nutné rozebrat a dokonale vyčistit od možné usazeniny proplachem vodou ještě před zaschnutím přípravku.

Oblast použití	Účel použití	kg/100 stromů	Ochr.prostředky
RECERVIN lesní dřeviny	ohryz a loupání kůry	110 - 130 kg	Poznámky

Upozornění: Před aplikací nesmí být přípravek vystaven vyšší teplotě než je maximální teplota skladovací (zákaz přímého rychlého ohřevu zdroji tepla o vyšší teplotě). Výrobce bere záruku za kvalitu výrobku ve smyslu platné PN. Protože však loupání a ohryz zvířel je ovlivňován řadou vnějších vlivů, jako dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvířete apod., neručí za eventuální poškození ošetřených kultur zvířel.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Případné změny v rozsahu použití jsou uvedeny v platném Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa.

Bezpečnostní opatření :

Při práci s přípravkem používejte pracovní oděv z textilního materiálu + pokrývku hlavy z textilního materiálu (např. čepice se štítkem), případně ochrannou zástěru z nanosované tkaniny, obličejový štít ŠP-15, ochranné rukavice z plastu nebo pryže, pryžové holinky. Při postřiku je třeba navíc použít štít + polomasku Protetika typ RU 20 s vložkovým filtrem A 1. Při ředění přípravku je vhodné používat navíc opryžovanou zástěru. Při práci a po ní, až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí teplou vodou a mýdlem, není dovoleno jíst, pít a kouřit.

Znečištěné pracovní oděvy lze vyčistit teplou vodou a 3% roztokem sody ve vodě nebo běžným saponátem. V případě, že přípravek již zaschl je nutno zároveň použít i mechanický způsob čištění, např. tvrdší kartáč. Používejte ochranné rukavice.

Přípravek není hořlavou kapalinou. Obsahuje jako rozpouštědlo vodu s přídavkem xylenu. S vodou se mísí pouze do zaschnutí pasty. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních a povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění : Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

Způsob likvidace obalu a neupotřebitelného zbytku :

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojtupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Oplachové vody lze použít na přípravu postřikové kapaliny, je-li to možné v místě aplikace přípravku. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních a povrchových vod. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako obaly. Obaly se zaschlými zbytky přípravku lze vyčistit mechanicky jemnou deformací PP kbelíku, kdy většina přilepeného zbytku přípravku z deformovaných stěn opadá. S takto vzniklým materiálem se zachází stejně jako s ostatními zbytky přípravku.

První pomoc :

Obecné zásady první pomoci :

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

Při stavech ohrožujících život je třeba přednostně provádět resuscitaci:

postížený nedýchá - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce

bezvědomí - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy

- a) při zasažení pokožky**
- odložte potřísněný oděv
 - omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo
 - zajistěte lékařské ošetření
- b) při zasažení očí**
- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím)
 - výplach provádějte nejméně 10 minut
 - zajistěte lékařské ošetření
- c) při požití**
- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu .
- d) při nadýchání**
- okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
 - zajistěte postiženého proti prochladnutí
 - zajistěte lékařské ošetření

Ošetřující lékař může další léčbu konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze, Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon : 02-24 91 92 93 .

Balení: kbelík PP s víkem Hmotnost : 10 kg

Podmínky správného skladování :

Recervin skladujte v originálních obalech v čistých a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních přípravků, hnojiv, hořavin a prázdných obalů od těchto látek.

Skladujte při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Stejně podmínky dodržujte při přepravě přípravku. Uvedené skladovací podmínky je nezbytně nutné dodržovat, jejich nerespektování vede ke znehodnocení přípravku. Spotřebujte pokud možno ještě v roce výroby.

Doba použití : 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v původních neporušených obalech

Poznámka pro uživatele: Tento prospekt má pouze informativní charakter. Při aplikaci přípravku se řiďte platnou etiketou.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci: NeraAgro, spol. s r.o., Neratovice, 277 11 , ČR , IČ 26 13 37 33

® ochranná známka NeraAgro, spol. s r.o. Neratovice

Informace o výrobku podá: Obchodní oddělení NeraAgro, spol. s r.o.

Tel. 315 66 44 60 Fax: 315 66 54 30

www.NeraAgro.cz